

## **COLICO INDUCIDO NUTRITIVO.**

El término "cólico" se refiere al dolor abdominal causado por varios factores. Sin embargo, la administración nutritiva es indicada con frecuencia y es una causa mayor de alboroto interno gástrico en el caballo.

Hay varios tipos de cólicos nutritivos, tal como: Impaction Intestinal, Tympanic (gaseoso), Torsión espasmódica e intestinal ( torció intestino).

El cólico de Impaction se ve con frecuencia en ciertas partes de España, donde la falta de lluvia y de forraje tiene como la deficiencia de fibra de resultado en el caballo. Esto es también verdad en caballos de establo que reciben pequeñas cantidades de forraje. El caballo comerá cualquier forma de materia fibrosa para satisfacer su deseo y las necesidades innatas para la fibra, tal como la ropa de cama de paja, la madera, la arena y el excremento, que a menudo impresiona en el intestino, especialmente si el caballo esta deshidratado. La regadera libre del acceso no sea subrayada excesivamente, especialmente en los climas calientes ni húmedos donde la deshidratación ocurre rápidamente. La incidencia de cólicos se puede erradicar virtualmente si se corrige la alimentación y los procedimientos de la administración se ponen en el lugar y el caballo tiene acceso libre para beber agua limpia. Dar de beber a los caballos en intervalos o dos veces diariamente no es suficiente y es uno de los motivos más comunes en la impaction gastrointestinal visto en España meridional.

Los regímenes regulares de worming son también críticos al nacer los caballos como muchas muertes y cólicos innecesarios son causadas por el daño de parásitos en el intestino que forra o impaction intestinal causó emigrando parásitos, especialmente cuándo worming un caballo que ha sido nacido sin tener previamente tratamiento.

## **LA PREVENCIÓN DEL COLICO NUTRITIVO**

- Asegúrese que los dientes estén en la orden buena para que el caballo pueda masticar y poder moler alimentos para la máxima absorción en la digestión y el alimento nutritivo.
- Emplea un programa anti-parasitario ( worming) conveniente para prevenir el daño de parásitos en las paredes y obstrucción intestinales del lumen del intestino.

Alimenta con una dieta alta (digerible) de fibra cumplimentada con pequeñas cantidades de comidas de una alta calidad, el alimento nutritivo equilibrado de concentrado de comidas.

- Alimenta con mínimo de un 1.5% del peso del cuerpo en Kg de forraje. Por ejemplo un caballo de 500 kg que realiza un trabajo medio debe consumir un mínimo de 7 kg de forraje diariamente.
- Asegúrese que todas las comidas sean de polvo y estén libres de moho. Que en las tiendas estén en un sitio fresco, limpio y seco. ¡tenga cuidado! las bacterias se encuentran comúnmente en los cereales.